

# 团 体 标 准

T/CVMA 73—2021

---

## 猫物理保定操作规范

Standard operating procedure of physical restraint technique of feline

2021 - 12 - 22 发布

2021 - 12 - 22 实施

---

中 国 兽 医 协 会 发 布

中国兽医协会  
CVMA

## 目 次

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 操作前准备.....	1
5 操作步骤.....	2
6 体征监测.....	5

中国兽医协会  
CVMA

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。


请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北京中农大动物医院有限公司提出。

本文件由中国兽医协会归口。

本文件起草单位：北京中农大动物医院有限公司、中国农业大学、北京小动物诊疗行业协会。

本文件主要起草人：蒋玉洁、杨文娟、田一男、王依菡、陆梓杰、李格宾、夏兆飞。



# 猫物理保定操作规范

## 1 范围

本文件规定了猫物理保定的操作前准备、操作步骤和体征监测。  
本文件适用于动物诊疗机构及其医务人员对猫进行物理保定操作。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**物理保定** physical restraint

由人力或器械等限制动物的活动从而达到人畜安全的方法。

## 4 操作前准备

### 4.1 环境需求

#### 4.1.1 密闭性

关闭门窗，并在操作期间限制人员流动，防止猫逃逸。操作环境内不宜存在可供猫藏身且不利于保定的狭窄空间。

#### 4.1.2 安全性

猫进行操作前应先确保环境中无致应激因素，如无关人员、犬、噪音等。若猫从应激环境中进入保定操作环境，不宜立即开始保定。若在诊室内进行保定操作，应将容纳猫的笼具放在操作台上，在操作开始前再将猫移出；移除操作环境内可能对脱离掌控的猫造成伤害或被其损坏的物品，如易碎物品、利器等。

### 4.2 所需设备与工具

#### 4.2.1 必需设备与工具

猫保定必需设备与工具包括：

- a) 伊丽莎白圈；
- b) 手套（医用橡胶手套/PE手套）；

- c) 可吸水垫料铺设在保定人员腿上或操作台面上；
- d) 根据保定后操作计划，将操作所需药品、耗材、仪器等，按照操作顺序摆放在可触及范围内。

#### 4.2.2 可选设备与工具

选用的设备与工具包括但不限于以下：

- a) 毛巾，用于暴躁猫的毛巾保定，毛巾长度至少为猫体长的三倍，宽度至少为猫体长的一倍；
- b) 保定手套，用于暴躁猫的搬运和保定，厚度及材质应保证难以被猫咬穿；
- c) 猫包，用于暴躁猫的保定，根据体型选择适宜尺寸；
- d) 航空箱/手提笼等用于搬运/移动猫的容器；
- e) 长柄网兜，可用于抓捕脱离控制的猫。

#### 4.3 人员要求

- 4.3.1 保定人员应具备助理兽医师执业资格证，且经过培训，了解猫的习性与行为学特点。
- 4.3.2 提前进行任务分配，根据操作要求制定保定计划，全体人员沟通可能出现的意外情况与处理方案。
- 4.3.3 保定人员应戴手套；可使用厚手套、毛巾等进行个人防护。

#### 4.4 动物准备

在保定前，猫应佩戴伊丽莎白圈。

### 5 操作步骤

#### 5.1 评估保定难度

在接触动物前，向宠主了解猫的习性。暴躁猫宜双人保定。只使用物理保定难以控制的猫，或物理保定可能致猫损伤时，宜选用化学保定。

#### 5.2 保定前操作

##### 5.2.1 开始接触

在接触猫前确认猫是否存在损伤，接触时避开损伤部位。与猫接触可按照如下步骤进行：

- 保持自信姿态，安静、缓慢地接近猫，同时呼唤其名字；
- 俯身/蹲下/坐下，降至与猫同一水平；
- 由侧面接近，缓慢靠近猫，若猫未出现紧张/恐惧/愤怒/攻击倾向，进行下一步操作。

##### 5.2.2 移出笼位

可徒手将猫抱出，或用毛巾包裹其全身，再缓慢抱出。

##### 5.2.3 搬运或移动

一侧手在胸骨位置托起胸腔，手臂支撑后驱，并使其紧靠保定人员，另一侧手控制双后肢。

#### 5.3 保定操作

##### 5.3.1 颈静脉穿刺保定

颈静脉穿刺保定操作步骤如下：

- a) 保定人员以稳定姿势坐好，使猫趴卧于腿上；
- b) 一侧手控制头颈部，使猫抬头，暴露颈静脉；
- c) 另一侧手同时抓住猫双前肢，食指插入双前肢之间，并向下拉。




图 1 猫颈静脉穿刺保定

### 5.3.2 侧卧保定

通常将猫侧卧保定于保定人员腿上，也可选取地面/桌面，操作步骤如下：

- a) 使猫侧卧于腿上或操作台面上，四肢朝向保定人员对侧，双手自上方越过，分别同时握住双前肢和双后肢，食指插在左右侧肢之间；如有需要，控制后肢的手可同时握住尾部；
- b) 进行内侧隐静脉采血时，保定人员控制上侧后肢及尾部，将下侧后肢交给操作人员；
- c) 使用双侧的腕部及前臂分别压住猫的颈肩部及臀部。




图 2 猫侧卧保定




图3 进行后肢隐静脉穿刺时，猫的侧卧保定




图4 将食指插于双前肢之间

### 5.3.3 毛巾保定

毛巾保定操作步骤如下：

- 将毛巾平铺于操作台面上；
- 猫放在距毛巾一端 1/3 处，短端紧裹住躯体，长端环绕躯体一周，仅露出头部；
- 根据操作暴露四肢或颈部。

### 5.3.4 猫包保定

猫包保定操作步骤如下：

- 需要双人操作，选用合适大小猫包，敞开置于操作台面上；
- 保定人员将猫以俯卧位放入猫包中，并保定住猫的肩背部及臀部，另一人迅速环绕并固定颈带、拉上拉链；
- 四肢可从拉链处伸出进行操作。

## 5.4 保定时操作

保定非暴躁猫时，应先采取最小程度保定，并随时准备增加保定力度。操作顺序按照疼痛及侵入程度由轻至重的顺序进行，以最快速度完成所有操作。解除保定前，操作人员应告知其他人员。

## 6 体征监测

操作人员时刻关注猫的呼吸、心血管状态，如呼吸模式、呼吸频率、黏膜颜色、精神状态等，防止保定对猫造成伤害。

---

中国兽医协会  
CVMA